


19) Кукушка — *Perisoreus infaustus* L.

Отряд Воробьинообразные — Passeriformes

Семейство Врановые — Corvidae



Краткое описание внешнего вида. Птица размером немного мельче сойки. Шапочка черноватобурая, спина и плечевые перья серые, с голубоватым или оливковым оттенком; брюшная сторона рыжевато-серая, иногда с большим количеством рыжего; на крыле ржаво-рыжее «зеркальце». Горло светло-буровато - серое. Хвост рыжий, с продольной

темной полосой посередине. Клюв и ноги черные.

Места обитания. Населяет преимущественно елово-пихтовую и кедрово-лиственничную тайгу. В Нижегородской области типичное местообитание – елово-пихтовая тайга; встречается также в борах.

Особенности биологии. Оседлая и кочующая птица. В гнездовое время молчалива и скрытна, в период кочевок криклива и заметна. Гнездо из сухих веточек, обильно оплетенных мхом и лишайниками, устраивает на деревьях на высоте от 2 до 6 м, как на суку у самого ствола, так и на ветвях далеко от ствола. В апреле – мае появляются кладки из 3 – 4 яиц зеленовато или грязно-серовато-белого цвета, с темными пестринами. Насиживание начинается с откладки первого яйца и длится 16 – 17 дней. В июне – начале июля происходит вылет молодых. Питается как животной, так и растительной пищей.